

III. Обработайте место укуса антисептиком

В качестве антисептика подойдут йод, спирт.



IV. Наблюдайте за ребенком

В течение нескольких недель контролируйте появление возможных симптомов инфекции.



Брошюра

Для воспитателей и родителей

Порядок действий, если ребенка укусил клещ



I. Вытащите клеща сразу, как только обнаружите его

1. Захватите клеща пинцетом или ниткой, завязав ее в узел как можно ближе к хоботку клеща.
2. Потяните клеща вверх, одновременно подкручивая нить или пинцет вокруг своей оси. В какую сторону крутить, не важно.
3. Если хоботок клеща остался в ранке, удалите его, как занозу. Для этого можно использовать:
 - иголку от стерильного шприца;
 - швейную иголку, предварительно прокалив ее на огне или обработав спиртом.
4. Чтобы вытащить клеща, можно использовать специальное устройство. Оно выглядит как маленький гвоздодер с лупой. Но применять его следует, только если вытаскиваете клеща целиком.



II. Сожгите вытасченного клеща или отправьте его на анализ



По рекомендации Минздрава: поместите клеща в герметичный флакон со смоченной ваткой внутри, сдайте его на анализ, ждите результатов. Если будет обнаружен возбудитель боррелиоза, врач назначит антибиотики.

По рекомендации СДС: сожгите вытасченного клеща. Профилактика боррелиоза начинается в зависимости от времени, которое клещ провел, присосавшись.